

Algemeen	
Therapeutische groep:	Antivirale middelen (integraseremmer bij HIV-infectie)
Merknaam:	Vocabria
Bepalingsfrequentie:	Uitbesteed onderzoek: alleen na overleg met de apotheker (Tel: 92500)
Doorlooptijd rapportage:	Uitslagen zijn bekend op einde dag van analyse
Analysemethode:	LC-MS/MS
Kwaliteitssysteem:	Uitbesteed onderzoek
Opmerking:	

Aanvraag specificaties	
Materiaal:	EDTA-plasma
Minimum hoeveelheid:	0,5 ml
Afname tijd:	Dalspiegel (bloed afnemen voorafgaand aan gift)
Bewaring:	-20°C en beschermd tegen licht (<i>direct na afname aluminiumfolie om de buis wikkelen!</i>)
Verzendconditie:	Kamertemperatuur, beschermd tegen licht
Aanvraagformulier:	https://ziekenhuisapotheek.catharinaziekenhuis.nl/aanvraagformulieren/

Referentiewaarden (milligram/L)	Therapeutisch	Toxisch
Spiegel 8 weken na 2e oplaaddosis, of 8 weken na laatste onderhoudsdosering	> 1,12	Niet bekend

Achtergrond informatie
De primaire indicatie voor TDM van cabotegravir is preventie van virologisch falen. Overige potentiële indicaties zijn: • Bij gemiste injectie of voor herstart van behandeling • Mogelijke spiegel-gerelateerde bijwerkingen • Speciale patiëntenpopulaties (zwangerschap, kinderen, BMI > 30 kg/m², etc) • Interacties met andere geneesmiddelen

Bronnen		
• https://tdm-monografie.org/cabotegravir/ • https://hivfrenchresistance.org/hiv-french-resistance-pharmacology-cabotegravir/		
Versiebeheer		
Versie 01	December 2024	1 ^e versie monografie opgesteld in ISO 15189 format.