

Algemeen	
Therapeutische groep:	Spijerrelaxantia bij spasmen
Merknaam:	Lioresal
Bepalingsfrequentie:	Na telefonisch overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker
Doorlooptijd rapportage:	Uitslagen zijn bekend op einde dag van analyse
Analysemethode:	LC-MS/MS
Opmerking:	Uitbesteed onderzoek

Aanvraag specificaties	
Materiaal:	EDTA-plasma
Minimum hoeveelheid:	0,5 ml
Afname tijd:	Dalspiegel (bloed afnemen voor de gift)
Bewaring: -20°C	Verzending: kamertemperatuur
Aanvraagformulier:	https://ziekenhuisapothek.catharinaziekenhuis.nl/aanvraagformulieren/

Referentiewaarden	
Therapeutisch:	0,08 – 0,40 (0,60) mg/L
Toxisch:	> 1,1 mg/L

Achtergrond informatie	
<ul style="list-style-type: none">Bepaling zinvol bij instellen, omdat in het begin door te snelle dosisverhoging overdosering kan ontstaan. Er dient dan ook insluipend en individueel te worden gedoseerd. Daarnaast zinvol bij mogelijke intoxicatie of wanneer er ondanks baclofen gebruik geen klinisch effect optreedt.	

Bronnen	
<ul style="list-style-type: none">https://toxicologie.org/baclofen/https://www.umcutrecht.nl/nl/bepaling/baclofen	

Versiebeheer		
Versie 01	Okt 2023	<ul style="list-style-type: none">1^e versie monografie opgesteld in ISO 15189 format.